

REGION
SJÆLLAND



- vi er til for dig

SKEDETEST

Test dig selv for klamydia

Vejledning til hjemmetest



SKEDETEST

Vejledning til hjemmetest for klamydia

For personer med en skede.



Du skal have disse ting fra testkittet klar:

Før du tager testen

Vent med at tage testen til to uger efter, at du har haft ubeskyttet sex.

Tag testen hurtigst muligt herefter.

Gå altid til lægen, hvis du har symptomer eller er bekymret for andre ting.




Podepind

Prøverør

Transportrør


Svarkuvert

1




- Tag podepinden ud af hylsteret.
- Rør mindst muligt ved prøveenden.

2



- Før podepinden ca. 5 cm op i din skede.

3



- Drej podepinden rundt i ca. 20 sekunder, mens podepinden rører ved din skedevæg.

4



- Tag prøverøret med det grønne låg.
- Skru låget af.
- Det er vigtigt, at væsken bliver i røret.

5



- Stik prøveenden af pødepinden ned i væsken.
- Knæk forsigtigt pødepinden af ved knækmærket.

6




- Lad den nederste del af prøvepinden blive i væsken.
- Skru det grønne låg fast på igen.
- Kassér den afknækkede del af pødepinden.

7




- Læg prøverøret i transportrøret.
- Skru det hvide låg fast på igen.

8



- Læg transportrøret i svarkuerten.
- Send kuerten samme dag, som testen er taget – hvis testen bliver for gammel, kasseres den.

9



- Porto er betalt, og modtagers adresse er på kuerten.
- Aflever svarkuerten, hvor du normalt sender pakker og breve.

Sådan får du svar

Hvis du er smittet

Du bliver ringet op af en sundhedsfaglig person, som fortæller dig om din behandling og giver dig recept på medicin. Du får også besked i din e-Boks om resultatet af prøven.

Hvis prøven ikke viser tegn på smitte

Du får besked i din e-Boks.