

Den gode henvisning

Indhold

Kæbeledsdysfunktion	2
----------------------------------	----------

Kæbeledsdysfunktion

Indgrebet:

Injektionsbehandling, artrocentese eller artroskopi

BEH00 injektionsbehandling af kæbeled
KTEG10 artrocentese af kæbeled
KEGA00 kæbeledsartroskopi

Det skal fremgå om patienten er færdigudredt ved egen tandlæge og om der er foretaget konservativ behandling

Henvisningsdiagnoser:

DS076 Lidelse i kæbeled
DK076A Smertebetinget funktionsforstyrrelse i kæbeled
DK076B Klik i kæbeled
DK076C Ankylose i kæbeled
DK076D Slidgigt i kæbeled
DK076E Kondromatose i kæbeled
DK076F Dislokation af ledskive i kæbeled

Indikation og udredning:

Kronisk smerte i hvile og/eller ved funktion, reduceret gabeevne eller recidiverende låsninger af kæbeleddet

Det forventes, at egen tandlæge har foretaget konservativ behandling. Denne skal være beskrevet i henvisningen:

Analgetika

Tabl paracetamol 1000 mg kombineret med tabl ibumetin 400 mg x maks 4 dagl anbefales

Refleksfrigørende stabiliseringskinne til overkæben

Det anbefales at anvende denne så meget af døgnets 24 timer som muligt

Gabeøvelser

Jvf patientvejledning

Andre anamnestiske oplysninger:

Allergi og MRSA status.

Aktuel medicin anføres og FMK ajourføres.

Kendt misbrug

Information:

Patienten skal være informeret om henvisningsårsagen, herunder operation, risici samt postoperativt forløb, og accepterer.

Eventuelt behov for tolk og hvilket sprog.